


DALMARELIN®
LECIRELINA 25 µg / mL
SOLUCIÓN INYECTABLE



DALMARELIN®
LECIRELINA 25 µg / mL
SOLUCIÓN INYECTABLE

■ **PERIODO DE RESGUARDO**

Cárner: cero (0) días
Leche: cero (0) horas

■ **PERIODO DE VALIDEZ**

2 años. El periodo de validez indicado se refiere al producto correctamente conservado en su presentación íntegra. Una vez abierto el producto tiene una validez de 28 días, mantenido en las condiciones de conservación señaladas.

Leer las instrucciones antes del uso

Prohibida su venta fraccionada

Reg. SAG N°:

Venta bajo receta médica veterinaria

USO VETERINARIO

Fabricado por:
FATRO S.p.A. - Via Emilia, 285
40064 Ozzano Emilia (Bologna) Italia
Importado y distribuido por:
Laboratorio Drag Pharma Chile
Invetec S.A.
Lautaro 300, Quilicura,
Santiago de Chile
Bajo licencia de **FATRO S.p.A.** - Italia



Dalmarelin®

lecirelina 25 µg/mL
solución inyectable

10 frascos
ampolla de

4 ml

ANALOGO SINTETICO DE GnRH

APROBADO
SAG

Señal
Fábrica de
Inyección
Vet.

00.00.00.00

■ **COMPOSICION**

1 ml contiene: **Principio activo:**
lecirelina acetato 26.5 µg equivalente
a lecirelina 25 µg - **Excipientes:**
c.s.p. 1 ml.

■ **INDICACIONES**

Véase la hoja ilustrativa interna.

■ **ESPECIES**

Vacas y yeguas.

■ **DOSIFICACION**

Véase la hoja ilustrativa interna.

■ **CONTRAINDICACIONES**

Ninguna.

■ **ADVERTENCIAS**

Su uso no está recomendado durante la gestación. En caso de contacto con la piel del operador se recomienda lavar inmediatamente con abundante agua y jabón. No manipular mujeres embarazadas.

■ **CONSERVACION**

Conservar entre 2 y 25°C, en un lugar fresco y seco, protegido de la luz.



Dalmarelin®

lecirelina 25 µg/mL
solución inyectable

10 frascos
ampolla de

4 ml

ANALOGO SINTETICO DE GnRH

25 MAYO 2010

REG. N° 2077-B
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO

DALMARELIN®
LECIRELINA 25 µg / mL
SOLUCIÓN INYECTABLE



APROBADO
SAG

25 MAYO 2010

REG. N° 2077-B
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO

DALMARELIN®
LECIRELINA 25 µg / mL
SOLUCIÓN INYECTABLE

APROBADO
S A G



lecirelina 25 µg/ml solución inyectable
 ANALOGO SINTETICO DE GnRH

USO VETERINARIO

DALMARELIN es una solución acuosa inyectable que contiene lecirelina, un análogo sintético de la hormona polipeptídico hipotalámica GnRH, que induce la liberación de las hormonas gonadotropinas LH y FSH por parte de la hipófisis frontal.

La lecirelina difiere de las hormonas naturales en que es un nonapéptido y no un decapeptido por sustitución de glicina en la décima posición con una etil-amina altamente lipofílica. Este cambio en la estructura incrementa la afinidad por receptores hipofisarios específicos, dando como resultado un aumento de los niveles de LH y FSH, así como una prolongación de sus efectos por un período superior a los 240 minutos, a diferencia de los 90 minutos de la hormona natural.

DALMARELIN está indicado en los casos de baja fertilidad debida a la inmadurez o a la madurez retardada del folículo y ovulación por secreción insuficiente de FSH y LH por parte de la hipófisis. La inoculación de gonadotropinas determina efectos exógenos no controlables fisiológicamente. En cambio, la administración de DALMARELIN determina la secreción de gonadotropinas hipofisarias controlable por el organismo mediante mecanismos de feed-back negativo.

■ **COMPOSICION**

1 ml contiene: **Principio activo:** lecirelina acetato 26,5 µg equivalente a lecirelina 25 µg - **Excipientes:** c.s.p. 1 ml.

■ **INDICACIONES**

Vacas:

- Tratamiento y prevención de quistes ováricos foliculares.
- Inducción de la ovulación al momento de la inseminación en casos de celos cortos, prolongados o silentes.

Yeguas:

- Inducción de la ovulación.
- Mejora de la tasa de concepción.

■ **CONTRAINDICACIONES**

Ninguna.

■ **DOSIFICACION**

La vía de administración aconsejada es la intramuscular.

Vacas:

- *Tratamiento de quistes ováricos foliculares*

50 µg de lecirelina (vía intramuscular), equivalente a 2 ml de producto, por animal una vez que se haya comprobado la existencia de quiste. Si a los 10 días no ha ocurrido desaparición o luteinización del mismo, aplicar una segunda dosis de 100 µg de lecirelina (vía intramuscular), equivalente a 4 ml de producto.

- *Prevención de quistes ováricos foliculares*

En vacas con antecedentes de lactancias anteriores de quistes foliculares, aplicar 50 µg de lecirelina (vía intramuscular), equivalente a 2 ml de producto, al día 14 post parto.

- *Inducción de la ovulación al momento de la inseminación en casos de ciclos cortos, prolongados o silentes*

50 µg de lecirelina (vía intramuscular), equivalente a 2 ml de producto al momento de la inseminación.

25 MAYO 2010

REG. N° 2077-B
 SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO

DALMARELIN®
LECIRELINA 25 µg / mL
SOLUCIÓN INYECTABLE

00.00.00.00

Yeguas:

- *Inducción de la ovulación y mejora de la tasa de concepción*
 4 ml. La administración se efectúa cuando, después de la inspección ginecológica, se diagnostica un folículo de por lo menos 40 mm de diámetro.
 El tratamiento debe ser repetido si después de un período de 24-36 horas no hay ovulación.

■ ADVERTENCIAS

- Su uso no está recomendado durante la gestación.
 - En caso de contacto con la piel del operador, se recomienda lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.
 - No manipular mujeres embarazadas.

■ PERIODO DE RESGUARDO

Carne: cero (0) días
 Leche: cero (0) horas

■ CONSERVACION

Conservar entre 2 y 25°C, en un lugar fresco y seco, protegido de la luz.

■ PLAZO DE VALIDEZ

2 años.
 Una vez abierto el producto tiene una validez de 28 días, mantenido en las condiciones de conservación señaladas.

■ PRESENTACION

- 1 frasco-ampolla de 4 ml
 - 10 frascos-ampolla de 4 ml
 - 1 frasco-ampolla de 10 ml
 - 5 frascos-ampolla de 10 ml
 - 1 frasco-ampolla de 20 ml

Reg. SAG. N°:

Venta bajo receta médico veterinaria

APROBADO
S A G

REG. N° 2077-B
 SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO

Fabricado por:
FATRO S.p.A. - Via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emilia (Bologna) Italia

Importado y distribuido por:
 Laboratorio **Drag Pharma Chile Invetec S.A.**,
 Lautaro 300, Quilicura. Santiago de Chile. Bajo licencia de **FATRO S.p.A.** - Italia

25 MAYO 2010